

Indikation und Applikation des
Atropins bei Iritis.

Inaugural-Dissertation

zur

Erlangung der Doctorwürde

in der

Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe

welche

nebst beigefügten Thesen

mit Zustimmung der Hohen Medicinischen Fakultät der Königl. Universität
zu Greifswald

am

Donnerstag den 5. Juli 1888

Mittags 11 Uhr

öffentlich verteidigen wird

Hermann Sinell

aus Pommern

Opponenten:

Herr M. Fuchs, cand. med.

Herr P. Hildebrand, cand. med.

Herr M. Knoth, cand. med.

Greifswald.

Druck von Julius Abel.

1888.

Digitized by the Internet Archive
in 2026

Seinen teuren Eltern

in Liebe und Dankbarkeit

gewidmet

vom

Verfasser

Die Anwendung der Mydriatica datiert vom Jahre 1801, wo Himly bei zufälliger Anwendung eines aus einer Auflösung des Bilsenkraut-Extractes bestehenden Augenwasser“ die pupillen-erweiternde Kraft dieses Medicaments kennen lernte und seine Beobachtungen über die lokale Anwendung des Extr. Hyosc., des aq. Lauros-Cerasi und des Extr. Belladonnae, welche letztere gleiche Eigenschaften zeigten, veröffentlichte. Himly kam zu dem Schlusse, dass diese Mittel, von denen Extr. Belladonnae das intensivste sei, ohne Schaden verwandt werden können, während ihre Anwendung in vielen Fällen grossen Nutzen bietet und zwar zur Herstellung von Myriasis behufs

- 1) sicherer Diagnosenstellung;
- 2) bequemerem Operierens im Pupillargebiet;
- 3) bei Verengerung der Pupille, die nicht mit Verklebung der Iris und Kapsel verbunden ist;
- 4) als Paliativmittel beim grauen Staar.

Trotz wiederholter Empfehlung von Seitz und Himly's, dem sich Joh. Adam Schmidt anschloss, fanden die Mydriatica vor der Hand keine begeisterte Aufnahme unter den Augenärzten, was daher rührte, mochte, dass sie in ungeeigneter Form angewendet nicht immer prompt wirkten und von üblen Nebenwirkungen begleitet waren. Zu letzterer wurde namentlich die Amblyopie gerechnet, über welche die Patienten regelmässig nach Anwendung der erwähnten Mydriatica klagten, und die auf Läsion der Retina hinzuweisen schien. Dass es sich nur um eine mangelhafte Accomodation infolge von Lähmung des Ciliarmuskels handelte, die zugleich mit der Mydriasis schwindet und deshalb unschädlich ist, wurde erst später erkannt.

Das in dem Extr. Belladonnae wirksame Alkaloid, das Atropin, wurde im Jahre 1819 von Brandes entdeckt und von Mein 1833 zuerst rein dargestellt. Aber auch die aus reinem Atropin hergestellte Lösung entsprach den gewünschten Anforderungen nicht, und erst nach Darstellung des schwefelsauren Salzes des Atropins war in diesem ein Mydriaticum geschaffen, welches schnell, sicher und ohne bemerkenswerte üble Nachwirkungen die Pupille erweiterte.

Das schwefelsaure Atropin wurde nun anstandslos unter die Therapeutica der Augenheilkunde aufgenommen, und bald stellte es sich heraus, dass die Application einiger Tropfen einer 1^o/oigen Lösung in den Conjunctivalsack die günstigsten Resultate erzielte, so dass von einer innerlichen Darreichung des Medicaments ganz abzusehen ist. Was die Indikation für den Gebrauch des Atropin betrifft, so ist es einleuchtend, dass es, da durch seine nervenlähmende Kraft ausser dem Accomodationsmuskel nur der sphincter pupillae ausser Aktion gesetzt und hierdurch die Iris contrahiert wird, als Therapeuticum nur angewendet werden kann, wo die Iris entzündet ist. Wäre jedoch die Indikation des Atropin bei Iritiden — von anderem sehe ich hier vorläufig ab — hiermit erschöpft, stünde der einfache Satz fest: „Bei jeder Affektion der Regenbogenhaut ist die Atropinlösung als Augenwasser zu verordnen“, so wäre nichts überflüssiger als diese Arbeit. Gerade bei Iritiden jedoch ist die Applicationsweise des Atropin noch so wenig präcisiert, indem darüber noch nicht allgemeine Regeln aufgestellt und allgemein angenommen worden sind, so dass man in den verschiedenen Lehrbüchern verschiedene Vorschriften findet.

Daher dürfte es sich wohl verlohnen, über einige

Fälle von Iritis, welche in der Greifswalder Augen-
klinik mit Atropin behandelt wurden, zu berichten
an ihnen die zweckmässigste Anwendungsweise zu
demonstrieren und die Indikation dazu klarzulegen.

In erster Linie ist das Atropin indiciert, um
Iritiden überhaupt zu verhüten und ist es daher bei
allen Augenleiden, welche, wie Kerato-Conjunctivitis
phlyctaenulosa, Keratitiden, Ulcera, Corneae, Sclero-
Episcleritis etc. mit totaler pericornealer Injection
einhergehen, sofort zu verordnen. Die ruhiggestellte
contrahierte und somit blutärmere Iris neigt weniger
dazu, sich an entzündlichen Processen zu beteiligen
als die ausgebreitete und leicht Blut aufnehmende
und Iritis kann so in vielen Fällen vermieden werden.
Dazu kommt, dass nach Lähmung des Accomodations-
muskels die Linse sich nicht vorwölben kann, Be-
rührung von Linse und Regenbogenhaut ausbleibt
und die Bildung von hinteren Synechien verhindert
wird.

Die Anwendungsweise des Atropins zum Zweck
der Prophylaxe ist einfach; es genügt bei den er-
wähnten Zuständen, täglich einmal einen Tropfen
einer 1%igen Lösung zu instillieren, um bei freier
Iris ausreichende Mydriasis zu erzeugen, ja man thut
gut, Patienten, bei denen man die Application de-

Atropins nicht selbst vornehmen kann, nur circa 5 gr einer $1\frac{1}{2} - 1\frac{1}{3}\%$ igen Lösung zu verschreiben, von welcher sie sich Morgens und Abends je einen Tropfen in das Auge bringen sollen.

Ist die Iris entzündet oder Verdacht dazu vorhanden, so hat das Atropin sogleich als Therapeutikum einzutreten. Die mehr oder weniger prompte Reaktion der Iris auf das Atropin belehrt uns, wie besonders Coccius hervorhob, einmal über Anwesenheit oder Fehlen einer Entzündung überhaupt, zweitens, im Falle, dass Entzündung vorhanden ist, über den Grad derselben; zugleich werden etwaige Synechien deutlicher gemacht. Bei mässiger Intensität der Erkrankung wird eine täglich ein- bis zweimal vorgenommene Application von je drei Tropfen innerhalb einer Viertelstunde genügen, um etwa vorhandene schmale Synechien zu lösen und durch reichliche und dauernde Mydriasis die Bildung neuer Synechien zu verhindern. Intoxicationerscheinungen werden bei dieser Anwendungsweise so gut wie nie auftreten, sollte es der Fall sein, so erreicht man durch Einträufeln einer 1%igen Lösung von Morphinum muriaticum in den Conjunctivalsack des andern Auges schnelle Linderung der Beschwerden.

Leichter tritt eine störende Intoxication ein,

wenn, wie es oft empfohlen wird, die Patienten zu Vornahme der Atropineinträufelung hingelegt werden. So tritt nicht nur die Resorption desselben durch das Gewebe des Saccus conjunctivalis und der Cornea ein, sondern es fließt nun auch die Atropinlösung durch die Thränenwege in den Rachen und weiter bis in den Magen. Bei aufrechter Stellung dagegen fließt die überschüssige Atropinlösung aus der Nasenöffnung und bleibt somit unschädlich.

Weit energischer hat die Therapie mit der Anwendung des Atropins vorzugehen, wenn es sich um stürmische Entzündung der Regenbogenhaut handelt in Fällen, wo dieselbe stark verfärbt, die Pupille eng und Verwachsungen mit der Linsenkapsel vorhanden sind. Hier muss durch Atropin maximale Mydriasis erstrebt und aufrecht erhalten werden, und dies hält oft recht schwer.

Derartige Fälle erheischen eine reichlichere Anwendung des Atropins, als die von „6—8 Tropfen Morgens, denen in sehr acuten Fällen Nachmittag 3—4 Tropfen beigelegt werden“, wie Knies dictum will. Der von Knies aufgestellten Behauptung „Mehr Atropin (wie eben bemerkt) zu geben, das Auge mit Atropin völlig zu überschwemmen, hat nicht mehr Wirkung, als die sorgfältige Applikation“

von 8—10 Tropfen am Tage“ stehen Beobachtungen aus der Greifswalder Augenklinik gegenüber, welche im Gegenteil beweisen, dass bei Anwendung von reichlicheren Dosen von Atropin als den angeführten, die Mydriasis einen höheren Grad erreichte, und selbst bedeutende Synechien noch gehoben werden konnten. Dafür, dass etwa zweimalige Applikation der Atropinlösung zur Erhaltung der erforderlichen Mydriasis bei heftiger Entzündung nicht ausreicht, spricht die einfache stets zu machende Beobachtung, dass die am Abend durch Atropin stark erweiterte Pupille am andern Morgen, d. h. nach 15—16 Stunden, bedeutend verengert ist, während die Pupillenweite von der klinischen Morgenvisite bis zur Abendvisite, also 8—9 Stunden nach der Anwendung des Atropin genügend weit blieb.

Es muss also in kleineren Zwischenräumen atropinisiert werden, besonders am späten Abend und am frühen Morgen.

Dass man bei Verabreichung von grossen Quantitäten von Atropin die Gefahr einer Intoxikation stets im Auge behalten muss, ist selbstverständlich — muss man doch in den heftigsten Fällen, wo die Iris nur äusserst träge reagiert, das Atropin geradezu bis zur Intoxikation geben, und es ist daher durch-

aus zweckmässig, von vornherein das Antidot Morphinum muriaticum in 1 % iger Lösung in das andere Auge zu instillieren, wodurch die Wirkung des Atropin in keiner Weise leidet und die Intoxikation in den meisten Fällen vermieden wird. Dabei sind die Patienten genau zu überwachen, um, falls Intoxikation durch Trockenheit im Halse und Rachen, Durst, gerötetes Gesicht, allgemeine Unruhe, Kopfschmerz, Beschleunigung der Puls- und Atemfrequenz, Zittern, ev. Hallucinationen und Dilirieren in Erscheinung treten und beunruhigende Dimensionen anzunehmen drohen sollten, rechtzeitig ein weiteres Fortschreiten derselben verhüten und sie durch Darreichung des Antidot morphium muriaticum in Form von Injectionen oder innerlich als Pulver heben zu können. Die Beseitigung der üblichen Zufälle ist leicht, in vielen Fällen schlimmer Argenügt schon einfaches Aussetzen des Atropin, so dass die Vergiftungsgefahr keine Kontraindikation zur energischen Applikation des Atropin ist.

Als Beleg für diese letzte Behauptung sei ein Fall von acuter Atropinvergiftung erwähnt, der in hiesiger Augenklinik zur Beachtung kam. Die Intoxikation äusserte sich in der heftigsten Weise, die Patientin redete irre, tobte und raste, so dass

der vertretende Assistenzarzt ein Psychose annahm und die Kranke der psychiatrischen Klinik überwies. Hier, wo die Patientin kein Atropin erhielt, liessen die bedrohlichen Erscheinungen bereits am nächsten Tage nach, und am folgenden Tage wurde die Patientin als geheilt entlassen, obwohl sie, da die Atropinvergiftung gar nicht diagnostiziert war, ein Antidot nicht erhalten hatte.

Endlich sei erwähnt, dass die Fälle von Iritis, in denen Atropin so häufig und energisch einge-träufelt werden muss, sich nicht mehr zur ambu-lanten Behandlung eignen; es genügt selbst nicht immer, dass man solche Leute ausser der gewöhn-lichen Stunde noch ein- bis zweimal zur Atropini-sierung kommen lässt, hier muss die Behandlung auf der stationären Klinik Platz greifen.

Zwei Fälle dieser Art hatte ich täglich selbst zu beobachten Gelegenheit, und möchte daher diese zur Erhärtung des oben Gesagten genauer schildern.

I.

Der 64jährige Arbeiter Christoph Weber aus Greifswald ist bereits seit drei Jahren wegen Iritis chronica beiderseits mit stärkeren Erscheinungen links mit Unterbrechungen in Behandlung gewesen.

Nach einer Pause von ungefähr 4 Wochen entwickelte sich wiederum ohne nachweisbare Ursache heftige Iritis links, so dass sich Patient am 1. März d. J. in der ophthalmologischen Poliklinik vorstellte und von dieser Zeit an ambulatorisch behandelt wurde. Die Iris des linken Auges war stark verfärbt, die Pupille eng, nasal waren drei schmale Synechien zu diagnosticieren. Nach Instillation einer 1%igen Atropinlösung erweiterte die Pupille sich langsam und unvollkommen. Patient erschien nun täglich einmal um 12 Uhr in der Poliklinik und erhielt innerhalb einer Viertelstunde 3 Tropfen der Atropinlösung. Jedoch blieb diese Art der Behandlung ohne günstigen Erfolg, indem die Pupille am nächsten Tage wiederum stark verengt war, sich neue Synechien bildeten und die pathologische Verfärbung der Iris nicht nachliess. Nach einiger Zeit wurde daher die täglich zweimalige Instillation von Atropin angeordnet, und die zweite Einträufung am Nachmittage um 5 Uhr in der vorher erwähnten Weise vorgenommen. Auch in dieser stärkeren Dosis, der stärksten, die nach Knies angewendet werden darf, war die Wirkung des Atropin eine unzureichende, so dass dem Patienten die Aufnahme in die hiesige Augenklinik angeraten wurde und

Am 24. April erfolgte. Nun wurde mit der Atropinisierung des erkrankten Auges energisch vorgegangen. Es wurden drei-, vier-, ev. fünfmal des Tages je 3 Tropfen der 1%igen Lösung verabreicht, während Morphinum in das gesunde Auge gegeben wurde. Diesem Verfahren wich die Entzündung, Synechien waren am 5. V. nicht mehr vorhanden, die Farbe fing an zur Norm zurückzukehren, und die Einwirkung des Atropins auf den Sphincter iridis machte sich in prompter Weise geltend, so dass von diesem Zeitpunkte an die Instillation weniger häufig vorgenommen werden konnte.

Intoxicationerscheinungen waren nicht aufgetreten. Am 8. V. war Patient soweit hergestellt, dass er die Klinik verlassen konnte, um später noch einige Male im Ambulatorium zu erscheinen. Die Farbe der Iris ist jetzt normal, die Reaktion gut, einige braune Pigmentfleckchen zeugen von den gesprengten Verwachsungen, Schmerzen und Sehstörungen sind nicht vorhanden.

II.


Der 22jährige Tischlergeselle Hermann Hennings aus Greifswald wurde seit dem 20. Juni an einer Keratitis parenchymatosa in der Poliklinik ambulant

behandelt. Die Entzündungserscheinungen waren stark ausgeprägt, und obgleich von Anfang an Atropin gegeben wurde, gelang es nicht, die Erkrankung auf die Cornea zu beschränken, so dass bereits am 24. heftige Iritis diagnostiziert werden musste. Die Iris war stark verfärbt und glanzlos, die Pupille nicht genügend erweitert, im Centrum der Cornea bestand ein Infiltrat. Patient klagt über fast ununterbrochene andauernde heftige Schmerzen. Die Aufnahme in die ophthalmologische Klinik erfolgte daher noch am demselben Tage. Es wurde nun 6—9 mal täglich Atropin angewendet und — da Patient von kräftiger Constitution — ausserdem vier Blutegel appliciert. Es trat sofort gute Erweiterung der Pupille und Nachlass der Schmerzen ein. Am 26. war genügend Mydriasis vorhanden und die Schmerzen fast ganz beseitigt, so dass von der häufigeren Application des Atropin abgesehen wurde. Trotzdem war die Entzündung noch nicht gehoben, vielmehr machte die Zunahme der Schmerzen und die grössere Myosis am 28. wiederum die reichlichere Anwendung des Atropins und Blutentziehung durch vier Blutegel nötig. Die Wirkung des Atropin blieb nicht aus. Das Schwinden der Schmerzen und die weitere Pupilerweiterung am 29. zeigen beginnende Besserung an, eine An-

nahme, welche durch den Befund am 30. bestätigt wird, wo auch die Verfärbung der Regenbogenhaut abgenommen zu haben scheint. Die Behandlung des Patienten mit Atropin wird fortgesetzt. Da jedoch die Erweiterung der Pupille jetzt ziemlich prompt erfolgt und gut andauert, werden die Instillationen in grösseren Zwischenräumen vorgenommen und steht zu hoffen, dass, nachdem das heftigste Stadium der Entzündung vorüber zu sein scheint, sich der weitere Verlauf normal gestalten und völlige restitutio ad integrum eintreten wird, zumal Synechien weder anfangs vorhanden waren, noch auch sich später entwickelten. Intoxicationserscheinungen wurden auch bei diesem Patienten nicht beobachtet.

Beide Krankenberichte bedürfen keines Commentars. Sie beweisen zur Genüge, dass die häufige Anwendung des Atropins unter Beobachtung der nötigen Kautelen und genügender Beaufsichtigung des Kranken unschädlich ist und zeigen, was Atropin bei heftigen Iritiden zu leisten vermag, wenn es in der richtigen Weise angewendet wird.

Zum Schlusse meiner Arbeit sei es mir vergönnt
Herrn Professor Dr. Schirmer für die gütige Über-
weisung des Themas, sowie für die lebenswürdige
Unterstützung beim Bearbeiten desselben meinen
aufrichtigsten Dank auszusprechen.



Literatur.

Knies, Grundriss der Augenheilkunde.

Schmidt-Rimpler, Augenheilkunde und Ophthalmoskopie.

Hersing, Compendium der Augenheilkunde.

Himly, ophthalmologische Beobachtungen.

Hugo Schulz, Grundriss der praktischen Arzneimittellehre.

Lebenslauf.

Ich, *Hermann Gustav Wilhelm Christoph Sinell*, evangelische Confession, wurde am 23. Mai 1862 als der jüngste Sohn des Lehrers an der höheren Stadtschule zu Pasewalk *Gustav Sinell* und seiner Ehefrau *Bertha*, geb. *Hering* geboren. Bis zu meinem 14. Jahr besuchte ich die höhere Stadtschule zu Pasewalk, ging Michaeli 1876 auf das Joachimsthal'sche Gymnasium zu Berlin und bestand Ostern 1883 das Abiturientenexamen auf dem Gymnasium zu Anklam. Ich bezog zuerst die Universität Tübingen, um nach 2 Semestern nach Berlin überzusiedeln. Ostern 1886 begab ich mich nach Greifswald. Wintersemester 1885/86 bestand ich das tentamen physicum und am 26. Juni 1888 das examen rigorosum.

Während meiner Studienzeit besuchte ich die Vorlesungen, Kliniken und Kurse folgender Herren Professoren und Dozenten.

In Tübingen:

Henke, Meyer, v. Reusch, Pfeffer.

In Berlin:

Du Bois-Reymond, Hofmann, Lewin, Rehmke, Waldeyer, Virchow.

In Greifswald:

*Beumer, Grawitz, Helferich, Krabler, Löbker, Mosler, Peiper,
Pernice, v. Preuschen, Schirmer, Schulz, Strübing.*

Allen diesen meinen hochverehrten Herren Lehrern sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank, ganz besonders aber dem Herrn Geheimrat Prof. Dr. *Mosler* und Herrn Prof. Dr. *Helferich*, in deren Kliniken ich als Volontair thätig sein durfte.



Thesen.

I.

Bei Iritis ist die Application des Atropins bis zur completen Mydriasis indicirt.

II.

Bei habitueller Scoliose des Kindes ergiebt die Behandlung mit Massage und zweckmässiger Gymnastik die besten Resultate.

III.

Bei Mittelohreiterung ist die Application der Politzer'schen Luftdouche der Ausspülung des Ohres und Einpuderung von acid. boric. hinzuzufügen.

